

OPDIVO® (nivolumab)

Patientkort

▼ OPDIVO är föremål för utökad övervakning för att snabbt kunna identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera eventuella biverkningar till din läkare.



Bristol-Myers Squibb

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1995. The public sector has also become an important employer of women, with 60% of the public sector workforce being female in 1995.

There are a number of reasons why the public sector has become an important employer of women. One reason is that the public sector has a high proportion of jobs that are traditionally held by women, such as teaching, nursing, and social work. Another reason is that the public sector has a high proportion of jobs that are part-time or flexible, which are more likely to be held by women. A third reason is that the public sector has a high proportion of jobs that are in the service sector, which is also a sector that is traditionally held by women.

The public sector has also become an important employer of women because it provides a number of services that are essential to the well-being of the community. These services include education, health care, and social care. The public sector is also responsible for the provision of many other services, such as housing, transport, and waste management.

The public sector has a number of advantages as an employer of women. One advantage is that it provides a high level of job security. Another advantage is that it provides a high level of pay and benefits. A third advantage is that it provides a high level of training and development opportunities.

There are also a number of disadvantages to working in the public sector. One disadvantage is that the public sector can be a slow-moving bureaucracy. Another disadvantage is that the public sector can be subject to political interference. A third disadvantage is that the public sector can be a place where women are often underpaid for the work that they do.

Despite these disadvantages, the public sector remains an important employer of women. It provides a number of services that are essential to the well-being of the community, and it provides a high level of job security, pay, and benefits. It also provides a high level of training and development opportunities.

The public sector has a number of challenges that it faces in the future. One challenge is that it needs to attract and retain a high quality workforce. Another challenge is that it needs to provide a high level of service to the community. A third challenge is that it needs to be able to pay its employees a fair wage.

Despite these challenges, the public sector remains an important employer of women. It provides a number of services that are essential to the well-being of the community, and it provides a high level of job security, pay, and benefits. It also provides a high level of training and development opportunities.

The public sector has a number of advantages as an employer of women. One advantage is that it provides a high level of job security. Another advantage is that it provides a high level of pay and benefits. A third advantage is that it provides a high level of training and development opportunities.

OPDIVO® (nivolumab)

Detta kort innehåller viktig information.

Bär alltid med dig detta kort och visa det om du behöver rådfråga en annan läkare (exempelvis om du reser).

Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa eller några andra symtom

LUNGOR¹

andningssvårigheter, hosta

MAGE OCH TARM¹

diarré (vattnig, mjuk eller lös avföring), blod eller slem i avföringen, mörkfärgad avföring, smärta eller ömhet i mage eller buk

LEVER¹

gulfärgade ögon eller hud (gulsot), smärta på höger sida av magtrakten, trötthet

NJURAR¹

minskad urinmängd

DIABETES/DIABETISK KETOACIDOS¹

törst, ökad aptit med vikt förlust, trötthet, svaghet, dåsighet, depression, irritation, allmän sjukdomskänsla, ökad urinmängd

HUD¹

allvarlig hudreaktion som hudutslag med eller utan klåda, blåsor och/eller hudfjällning (potentiellt livshotande), sår, torr hud, hudknutor

HORMONPRODUCERANDE KÖRTLAR¹

huvudvärk, dimsyn eller dubbelseende, utmattning, trötthet, vikt förändring, beteendeförändringar (t.ex. minskad sexlust, irritation eller glömska)

MUSKLER (INKLUSIVE HJÄRTA)¹

tecken och symtom på myosit (inflammation i musklerna), myokardit (inflammation i hjärtmuskeln) och rabdomyolys (nedbrytning av skelettmuskel) vilket kan yttra sig som muskel-smärta, stelhet, svaghet, bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning, förvirring, minskad urinmängd, mörk urin eller uttalad trötthet

ÖVRIGT¹

smärta eller rodnad i ögat, dimsyn eller andra synproblem; smärta i övre delen av buken (inflammation i bukspottkörteln), minskad aptit, illamående eller kräkning; matsmältningsbesvär eller halsbränna; stickningar eller domningar i armar och ben eller svårigheter att gå, feber, svullna lymfkörtlar, tecken eller symtom på inflammation i hjärnan, som kan inkludera huvudvärk, feber, krampfall, nackstelhet, trötthet, förvirring, svaghet eller dåsighet

VIKTIGT

- Tidig hantering av biverkningar minskar risken för att behandlingen med Opdivo (nivolumab) eller Opdivo i kombination med Yervoy (ipilimumab) måste stoppas tillfälligt eller permanent, vilket möjliggör att patienten kan få ut maximal nytta av behandlingen.
- Symtom som tycks vara milda kan snabbt förvärras om de inte behandlas.¹
- Försök inte att behandla dessa symtom på egen hand.
- Rapportera dessa eller andra symtom till din läkare direkt.
- Tecken och symtom kan ibland uppträda sent, det vill säga veckor eller månader efter din sista dos.¹
- Bär detta patientkort med dig, visa det för all sjukvårdspersonal som du träffar och uppge att du behandlas med Opdivo (nivolumab) eller Opdivo i kombination med Yervoy (ipilimumab).

BERÄTTA OMEDELBART FÖR DIN LÄKARE OM DU:

- vet att du är allergisk mot Opdivo (nivolumab), något annat läkemedel eller beståndsdel i ett läkemedel.
- har en autoimmun sjukdom.
- har melanom i ögat.
- har fått biverkningar vid behandling med ett annat läkemedel, t.ex. Yervoy (ipilimumab).
- har fått veta att cancer har spridit sig till hjärnan.
- har tagit läkemedel som dämpar ditt immunförsvar. OPDIVO kan orsaka avstötning av transplanterade organ.
- tidigare har haft inflammation i lungorna.
- är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.
- tar eller har tagit andra läkemedel.
- står på en saltfattig kost.

För mer information, se Opdivo bipacksedel som medföljer förpackningen samt finns på fass.se eller ring Medicinsk Information på telnr: 08-58 50 73 04.

Kontaktuppgifter till min läkare

Läkarens namn:

.....
.....

Telefonnummer arbete:

.....
.....

Telefonnummer efter kontorstid:

.....
.....

Mina kontaktuppgifter

Mitt namn och telefonnummer:

.....
.....

Kontaktinformation vid en nödsituation:

.....
.....

VIKTIG Information för sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med Opdivo (nivolumab) eller Opdivo i kombination med Yervoy (ipilimumab).
- Immunrelaterade biverkningar kan uppträda när som helst under behandlingen eller månader efter avslutad behandling.
- Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att minimera livshotande komplikationer. En Opdivo-specifik hanteringsguide för immunrelaterade biverkningar finns tillgängligt.
- Om du inte är specialist inom onkologi, hematologi eller lungmedicin, vänligen kontakta en specialist.

För mer information, vänligen se OPDIVO® produktresumé (SmPC) på fass.se, länk till Hanteringsguide och patientkort finns på fass.se/Vårdpersonal och Opdivo.se/materialbeställning eller ring Medicinsk Information på telnr: 08-58 50 73 04.

1. OPDIVO® bipacksedel.