

OPDIVO[®] *(nivolumab)*

Patientinformation och behandlingsdagbok

Till dig som behandlas med
OPDIVO[®] (nivolumab)



Bristol-Myers Squibb

WWW.BMS.SE

OPDIVO[®]
(nivolumab)

Inledning

Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du veta mer om läkemedlet och vad du kan vänta dig i samband med din behandling. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som du bör vara vaksam på samt vad du ska göra om du upplever dessa symtom.

För fullständig information, se bipacksedeln för OPDIVO på www.fass.se

Om OPDIVO

Immunsystemet består av ett antal olika celler, inklusive T-celler som är en del av kroppens naturliga försvar. T-cellerna hittar och förstör celler som kroppen anser som främmande, såsom bakterier, virus och cancerceller. Ibland kan dock cancerceller hitta sätt att gömma sig från immunsystemets försvar, vilket leder till att cancer kan växa och sprida sig. OPDIVO® hjälper genom att stoppa cancercellernas blockering av immunsystemets T-celler.

Eftersom den här behandlingen fungerar genom att aktivera ditt immunsystem, kan den ge biverkningar som orsakas av att ditt immunsystem blir överaktivt och börjar attackera friska celler. Det är viktigt att du hör av dig tidigt till din behandlande läkare eller sjuksköterska om du upplever symtom eller tecken på biverkningar. Vidare information om biverkningar relaterat till behandling kan du läsa om under avsnittet "Biverkningar av behandlingen" på sidorna 5–6.

OPDIVO® kan användas för att behandla flera olika typer av cancer och kan även ges i kombination med YERVOY™ (ipilimumab).

Före behandling med OPDIVO

Före behandling kommer din läkare att kontrollera din allmänna hälsa. Du kommer också få ta **blodprover** under din behandling.

Före behandlingen kommer du och din läkare att gå igenom om:

- du har en **autoimmun sjukdom** (ett tillstånd där kroppen angriper sina egna celler)
- du har **melanom i ögat**
- du **tidigare** har fått YERVOY™ och fick **allvarliga biverkningar** av detta läkemedel
- din **cancer har spridit sig till hjärnan**
- du tidigare har haft **inflammation i lungorna**
- du tar eller nyligen har tagit andra **läkemedel**

Tala om för din läkare om du är eller tror du är gravid, om du planerar att skaffa barn eller om du ammar. **Det är viktigt att skydda sig mot graviditet.**

Hur OPDIVO ges

OPDIVO kommer att ges till dig via en infusion (dropp) in i en ven, i blodet under 60 minuter varannan vecka. Mängden OPDIVO beräknas utifrån din kroppsvikt. Rekommenderad dos är 3 mg OPDIVO per kg kroppsvikt. Tala om ifall du går upp eller ner i vikt.



Dagen du får behandling kan det hända att du upplever allmän sjukdomskänsla. Din behandlande läkare och sjuksköterska kan i så fall informera dig om hur detta kan behandlas.

Din läkare kommer fortsätta ge dig OPDIVO så länge som du har nytta av det eller tills du inte längre tolererar behandlingen. Det är din läkare som utvärderar behandlingen till exempel genom röntgen.

Om du missar en inbokad tid för behandling

Det är mycket viktigt för dig att du kommer till dina inbokade besök för att få OPDIVO. Om du missar en behandling kommer din läkare att planera in när du ska få din nästa dos.

Biverkningar av behandlingen

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem. OPDIVO påverkar ditt immunsystem och kan orsaka inflammation i delar av kroppen. Inflammation kan orsaka allvarlig skada på kroppen och vissa inflammatoriska tillstånd kan vara livshotande och behöva behandling, eller kräva att behandlingen med OPDIVO avbryts.

Det är mycket viktigt att biverkningar upptäcks tidigt, eftersom de då kan behandlas och därmed förhindra att tillståndet förvärras

De allra flesta biverkningar relaterade till din behandling kan åtgärdas. Din läkare kan till exempel besluta att ge dig andra läkemedel för att minska symtomen och förhindra komplikationer, senarelägga nästa dos eller avsluta behandlingen. Tidiga åtgärder för att motverka biverkningar minskar risken för att behandlingen med OPDIVO behöver avbrytas. Det är viktigt att du hör av dig tidigt till din behandlande mottagning om du misstänker en biverkning eller inte mår bra.

Biverkningar av OPDIVO kan inträffa när som helst under behandlingen. Var uppmärksam då biverkningar även kan uppkomma veckor eller månader efter din sista dos.

Det är viktigt att du hör av dig tidigt till din behandlande mottagning om du misstänker en biverkning

Biverkningar av behandlingen

Kontakta omedelbart din läkare eller sjuksköterska om du upplever något av dessa tecken eller symtom:



Problem med levern: tecken och symtom kan vara gula ögonvitor eller gulaktig hud (gulsot), smärta på höger sida av magtrakten eller trötthet.



Diarré: vattnig, lös eller mjuk avföring eller andra symtom på **inflammation i tarmarna** (kolit), som magsmärter och slem eller blod i avföringen.



Problem med njurarna: tecken och symtom kan vara minskad urinmängd.



Problem med lungorna som andningssvårigheter eller hosta. Detta kan vara tecken på inflammation i lungorna.



Inflammation i musklerna såsom myokardit (inflammation i hjärtmuskeln), myosit (inflammation i musklerna) och rabdomyolys (stelhet i muskler och leder, muskelkramp). Tecken och symtom på det kan yttra sig som muskelsmärta, stelhet, svaghet, bröstsmärta eller kraftig trötthet.



Problem med hormonproducerande körtlar (omfattande sköldkörtel och binjurar): tecken och symtom på att dina körtlar inte fungerar normalt kan vara extrem trötthet, viktförändring eller huvudvärk och synrubblningar.



Diabetes (symtom som överdriven törst, kraftigt ökad urinmängd, ökad aptit med vikt förlust, trötthetskänsla, dåsighet, svaghet, depression, irritabilitet och allmän sjukdomskänsla) eller diabetisk ketoacidosis (syra i blodet som kommer från diabetesen).



Inflammation i huden som kan orsaka allvarlig hudreaktion (känd som toxisk epidermal nekrolis och Stevens-Johnsons syndrom). Tecken och symtom på allvarlig hudreaktion (ibland dödlig) kan yttra sig som utslag, klåda och hudavlossning.

Kontakta omedelbart sjukvårdspersonalen om du upplever tecken eller symtom som nämns i denna broschyr eller om du får andra biverkningar. Att få medicinsk behandling i tidigt skede kan förhindra att problemet blir allvarligt.

Försök inte behandla dina symtom med andra läkemedel på egen hand.

För fullständig lista på biverkningar, se bipacksedeln för OPDIVO på fass.se

Ditt patientkort

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig ett patientkort. Det innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan, under och efter din behandling med OPDIVO. Det innehåller också information som all medicinsk personal behöver känna till om din behandling. Därför är det viktigt att du visar ditt patientkort för all sjukvårdspersonal som du är i kontakt med. Det gäller även vid dina besök på vårdcentral eller sjukhus.

Om du inte har fått ett patientkort eller om du har förlorat det, fråga din behandlande läkare eller sjuksköterska om ett nytt.

Bär alltid patientkortet med dig och visa upp det om du skulle behöva uppsöka en annan läkare, t.ex. om du är på semester. Det innehåller viktig information om symtom som kan behöva behandlas i samråd med din behandlande läkare

Din behandlingsdagbok

Den här dagboken är till för att göra det lättare för dig, din läkare och din sjuksköterska att tidigt upptäcka symtom på biverkningar som kan uppstå vid din behandling med OPDIVO. Om symtomen upptäcks tidigt kan de oftast behandlas och förhindra att biverkningen förvärras.

Ta dig tid att fylla i dagboken och ta med den vid varje besök hos din behandlande läkare eller sjuksköterska.

	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /
Hur mår du?	  	  	  	  	  	  	  
Kan du utföra dina normala aktiviteter?	  	  	  	  	  	  	  
Är du illamående och/eller kräks?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din avföring lös eller vattnig?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du sett blod eller slem i din avföring?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din tarmtömning smärtsam?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du fått en ny hosta eller förvärrad hosta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du problem att andas eller andnöd?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig extremt trött?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig stel i muskler och leder eller haft bröstsmärta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ

Kontakta din behandlande mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.

	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /
Hur mår du?	  	  	  	  	  	  	  
Kan du utföra dina normala aktiviteter?	  	  	  	  	  	  	  
Är du illamående och/eller kräks?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din avföring lös eller vattnig?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du sett blod eller slem i din avföring?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din tarmtömning smärtsam?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du fått en ny hosta eller förvärrad hosta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du problem att andas eller andnöd?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig extremt trött?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig stel i muskler och leder eller haft bröstmärta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ

Kontakta din behandlande mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.

	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /
Hur mår du?	  	  	  	  	  	  	  
Kan du utföra dina normala aktiviteter?	  	  	  	  	  	  	  
Är du illamående och/eller kräks?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din avföring lös eller vattnig?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du sett blod eller slem i din avföring?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din tarmtömning smärtsam?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du fått en ny hosta eller förvärrad hosta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du problem att andas eller andnöd?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig extremt trött?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig stel i muskler och leder eller haft bröstmärta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ

Kontakta din behandlande mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.

	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /
Hur mår du?	  	  	  	  	  	  	  
Kan du utföra dina normala aktiviteter?	  	  	  	  	  	  	  
Är du illamående och/eller kräks?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din avföring lös eller vattnig?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du sett blod eller slem i din avföring?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din tarmtömning smärtsam?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du fått en ny hosta eller förvärrad hosta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du problem att andas eller andnöd?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig extremt trött?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig stel i muskler och leder eller haft bröstmärta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ

Kontakta din behandlande mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.

	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /
Hur mår du?	  	  	  	  	  	  	  
Kan du utföra dina normala aktiviteter?	  	  	  	  	  	  	  
Är du illamående och/eller kräks?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din avföring lös eller vattnig?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du sett blod eller slem i din avföring?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din tarmtömning smärtsam?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du fått en ny hosta eller förvärrad hosta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du problem att andas eller andnöd?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig extremt trött?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig stel i muskler och leder eller haft bröstmärta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ

Kontakta din behandlande mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.

	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /
Hur mår du?	  	  	  	  	  	  	  
Kan du utföra dina normala aktiviteter?	  	  	  	  	  	  	  
Är du illamående och/eller kräks?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din avföring lös eller vattnig?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du sett blod eller slem i din avföring?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din tarmtömning smärtsam?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du fått en ny hosta eller förvärrad hosta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du problem att andas eller andnöd?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig extremt trött?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig stel i muskler och leder eller haft bröstsmärta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ

Kontakta din behandlande mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.

	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /
Hur mår du?	  	  	  	  	  	  	  
Kan du utföra dina normala aktiviteter?	  	  	  	  	  	  	  
Är du illamående och/eller kräks?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din avföring lös eller vattnig?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du sett blod eller slem i din avföring?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din tarmtömning smärtsam?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du fått en ny hosta eller förvärrad hosta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du problem att andas eller andnöd?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig extremt trött?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig stel i muskler och leder eller haft bröstmärta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ

Kontakta din behandlande mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.

	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /	dagen den /
Hur mår du?	  	  	  	  	  	  	  
Kan du utföra dina normala aktiviteter?	  	  	  	  	  	  	  
Är du illamående och/eller kräks?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du aptitförlust eller känner dig mindre hungrig än vanligt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Hur många tarmtömningar har du varje dag?							
Är dina tarmtömningar fler än normalt?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din avföring lös eller vattnig?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du sett blod eller slem i din avföring?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Är din tarmtömning smärtsam?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du fått en ny hosta eller förvärrad hosta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du problem att andas eller andnöd?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft klåda, hudutslag, blåsor, sår eller hudfjällning?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du konstant eller ovanlig huvudvärk?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig extremt trött?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft förändringar i humör eller beteende såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft domningar, smärta eller svaghet i musklerna eller svårigheter att gå?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du känt dig stel i muskler och leder eller haft bröstmärta?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ
Har du haft smärta och rodnad i ögat, synproblem eller dimsyn?	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ	☐ JA ☐ NEJ

Kontakta din behandlande mottagning omedelbart om du känner dig dålig under behandlingen så att de kan hjälpa dig.



För fullständig information, se bipacksedeln
för OPDIVO på **www.fass.se**

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

OPDIVO® är en immunterapi som används för att behandla vuxna med:

- framskriden melanomsjukdom (en typ av hudcancer)
- framskriden icke-småcellig lungcancer (en typ av lungcancer)
- framskriden njurcellscancer
- Hodgkins lymfom, där sjukdomen kommit tillbaka efter eller inte svarat på tidigare behandlingar, inklusive autolog stamcellstransplantation (en trans-

plantation av dina egna blodproducerande celler)

- framskriden huvud- och halscancer
- framskriden urotelcellscancer (urinblåse- och urinvägscancer)

OPDIVO kan ges i kombination med ipilimumab vid melanomsjukdom. Det är viktigt att du också läser bipacksedeln för det läkemedlet. Fråga din läkare om du har frågor om ipilimumab.

Den verksamma substansen i OPDIVO heter nivolumab.

Använd inte OPDIVO om du är allergisk mot nivolumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till OPDIVO på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare.

Styrka och förpackning:

OPDIVO är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan

10 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 4 ml eller 1 injektionsflaska à 10 ml.

Ytterligare information:

För fullständig information om OPDIVO, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol-Myers Squibb AB
Tel: 08-7047100
www.bms.se



Bristol-Myers Squibb

WWW.BMS.SE NOVEMBER 2017 1506SE17NP04916

OPDIVO®
(nivolumab)